フ。臺灣デハ新竹(五指山)、臺中(南投、大雁壓)、臺南カラ報告サレテキルガ遙カ北ノ種子ケ島ニ現ハレタ事ハ注目ニ價スル。支那デハ香港以外ニアマリ 知ラレナカツタガ最近 CHIEN PÉI ハ廣東省内ノ Chengkon, Panling-tze 間及ビ Lantau 島デ報告シタ(Sinensia, 7-4 p. 472)。コノ種ハー見琉球臺灣ニ多イ Clematis Meyeniana ヲ思ハセルガ小葉ハ心臓形ノカハリニ鋭脚デアリ質がもちのき程モ厚イノデ區別ガツク。

2 Rubus Grayanus Maximowicz in Mél. Biol. 8 p. 382 (1871) りうきういちご、しまあはいちごコレハ八重山、沖繩本島、大島列島、 屋久島=分布シテキルモノデ、種子ケ島ノ古田官有林=アツテモ不思議デハナイが、 岩政氏ノ採集シタモノハー寸型ガ異ツタモノデアツタ。即手葉ガ非常=厚クナツテキテ、 Maximowicz ガ原記載中デ "foliis…… subtus pallidis et ad venas petiolisque lamina breviores parce molliter pilosis"ト言ツテキル毛が殆ンド無毛ト言ツテヨイ位=少ク、 平滑=ナツタ品デアル。又コノ標本ニハ若イ直枝が添ヘテアツテ、コレ=生ジタ葉ハ三裂片ヲナシ莖ヤ、又稀=葉柄=カナリ鋭イ棘がアリ、7 mm 位ノ長サノ線狀ノ托葉がアル。コレハ Maximowicz モ期待シナカツタ事デ "Procumbens adnascens inermis……foliis……stipulis nullis……"ト書イテキル。

[昨年十月號/訂正] 659 頁 13 行目 confusa ハ confusa トナル。

OBerberis alpicora °C. SCHNEIDER——草木手帖 No. 1 (木村陽二郎)

本年/ Fedder, Repertorium novarum regni vegetabilis = Schneider 氏ハ Nene Berberis der Sect. Wallichianæ ヲ書キコレニ70種ヲ認メ支那産16新種6新變種、ビルマ産、4新種、ブータン産1新種、アツサム産2新種ヲ書キ臺灣ニ1938年 E. H. Wilson ノ採集=依ル Arnold Arboretum ノ腊葉ヲ Type トシテ新種 Berberis alpicora ヲ記載シタ。ソシテコノ新種ハ B. Kawakamii Hayata =似ルモ葉ハヨリ小サク、コリ多数ノ鬱入アル鋸歯アリ 4 胚珠ヲ持ツ事=依リ異ルトサレ B. Kawakamii ノ高山型ナラントサレテキル。氏ハ花ヤ熱セル果ヲ知ラナイ。筆者ハ氏ノ新種ハ B. morrisonensis Hayata ト同一物ト考ヘル。B. Kawakamii トテモ記載ニハ 2-3-seed トアルケレドモ東大所蔵ノ早田博士ノ圖ニテハ胚珠ハ 3 或ハ 4 個ト記シアリ B. morrisonensis デハ 3-seed トアルが胚珠ノ時ヨリ熱シタ種子ノ数ハ減ズル事がアリコレ=依ル區別ハ困難デアル、B. Kawakamii ト B. morrisonensis トノ關係ハ更=研究サルベキデアラウ。


Berberis morrisonensis HAYATA, Mater. Fl. Formos. (1911) 25; Icon. Fl. Formos. 1 (1911) 41, t. 10.

Berberis alpicora C. Schneider in Fedde, Repert. 46 (1939) 253. syn. nov.

○あふぎばせんとうさう ──草木手帖 No. 2 (木村陽二郎)

阿波神領村ナル同一場所同一日付デ草木研究會會員阿部進一氏ハ小葉ノ切レノ細カイせんとうさうト共ニコノー品種あぶぎばせんとうさうヲ採集サレタ。せんとうさうノ小葉ノ

切い方ハソノ程度ニ色々アルガコトニー品種トシテ採リ得ル。



Chamaele decumbens f. flabellifoliolata

Chamaele decumbens Makino forma flabellitoliolata Y. Kimura f. nov.

Lamina foliorum bi-tri-pinnatisecta, segmentis primariis petiolulatis, secundariis brevipetiolulatis v. subsessilibus, ultimis subrotundatis, late rhombeis vel flabelliformibus apice profunde dentatis basi cuneatis.

Nom Jap. Ôgiba-sentôsô.

Hab. Sikoku, Prov. Awa, Myosaigun, Zinryô-mura (S. Abe. no. 40, 23 Maio 1937, no. 2 Maio 1938—Typus in Herb. Univ. Imp. Tokyo.). Prov. Suruga, Huzietakakusayama (D. Schimidzu, no 118, 3 Maio 1930).

○しろばなほつつじ——草木手帖 No. 3(木村陽二郎)

草木研究會會員外山三郎氏ハ肥前國多良岳ニ於テ ほつしじノ

(×1) 白花品ヲ得ラレタ。 花瓣ハ純白デ 只表面先端ハ若イ花デハ少シ ク黄緑色ヲ帯ビル。花柱モ純白ダガ中央部ハ 稍々赤味ヲ帶ビル事ガアル。同氏ノ好意ニヨ リ昨年ハ生品ヲ見ル事ヲ得タ。 コレニレるばなほつつじノ名ヲ與ヘル。

Tripetaleia paniculata Siebold et Zuccarini in Abh. Akad. Wiss. Muench. 3 Abt. 3 (1843) 732 et 3 (1843) fig. 2.

forma albiflora Y, KIMURA, f. nov.

Petala nivea.

Nom. Jap. Sirobana-hotutuzi.

Hab. Kyûsyû, Prov. Hizen, Mt. Taradake (S. Toyama, 26 Jul. 1938—Typus in Herb. Univ. Imp. Tokyo).

何當教室ノ腊葉室ニハ九州産ノほつつじトシテハ 田代安定氏明治 25 年採集多良岳ノモノ及ビ F. C. GRBATREX 氏 1929 年温泉岳採集ノモノ及ビ筆者ノ 1989 年祖母山採集ノモノヨリナカツタ。他ノ産地ノ標品ガ得ラレル事ガ望マシイ。

Oひめえごのき──草木手帖 No. 4 (木村陽二郎)

草木研究會員吉岡重夫氏ノ採集品=花モ葉モ小サナえどのきノー品種ガアル。氏=依レバ全株葉ハ皆小形トノ事デアル。コレヲひめえどのきト名付ケル、産地ハ豐前築上郡岩屋村デアル。

Stylax japonica Siebold et Zuccarini, Fl. Jap. 1 (1835) 53, t. 23.

forma parviflora Y. KIMURA f. nov.

Folia parva 2-3 cm longa 1—1.2 cm lata oblonga utrinque attenuata. Flores